



I A S P

International Association for Suicide Prevention

World Health Organization

10 de septiembre de 2011

Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Previene el suicidio en sociedades multiculturales



Promedio diario de suicidios a nivel nacional según sexo, 2000-2008



- Los desórdenes mentales, particularmente la depresión y el alcoholismo representan uno de los más importantes factores de riesgo para el suicidio.
- Alrededor de tres mil personas por día sucumben ante el suicidio en todo el mundo, y por cada una, aproximadamente 20, tienen intentos fallidos.
- La tasa de mortalidad mundial indica que una persona se suicida cada 40 segundos.
- Si el año 2000 fallecían casi 3,3 hombres por día, en el año 2008 aumentó a 4,5 suicidios. En cambio, las mujeres en el 2000 era 0,5 y para el año 2008 aumenta su frecuencia a 1,1 suicidios por día. Nahuelpán E., Varas J. *El suicidio en Chile: Análisis del fenómeno desde los datos médicos legales.* [Revisado en: http://www.sml.cl/proyectos/estadistica/documentos/SUICIDIO_EN_CHILE_2000-2008.pdf]

Los procesos que pueden llevar a alguien al Suicidio son largos y dolorosos, y tu también puedes ayudar a prevenirlos

Para más información visita <http://www.iasp.info/wspd/>

Material preparado por el Comité CPAIS FELSOCM - Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina SCem-UDEC
www.scemudec.cl / scemudec@udec.cl
Concepción, septiembre de 2011

